

CÓMO ENTENDER LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS



POR

Kitadol

SUPER-K

Después de todos los trámites de marzo, mi stock de Kitadol Forte se agota, pero siempre guardo unas cajitas para abril, porque aparece la amada (e incomprensible)

Devolución de Impuestos ¡Eeehhh!

Si tú también eres de los que cuando entra al SII le pregunta al compañero de al lado “¿dónde tengo que entrar?” (y ves que tu compañero está igual de perdido que tú) te vamos a explicar con peras y manzanas (o las frutas que más te gusten) cómo se hace la declaración y devolución de impuestos.

SII

No, no es una afirmación con emoción y su opuesto no es el NOO, el SII es el Servicio de Impuestos Internos, que son los encargados de ver nuestros impuestos (y devolverlos) año a año. Para hacer tu declaración, primero tienes que entrar sii.cl y ya estando adentro, surgirá una impresionante pregunta:

¿Y CUÁL ERA MI CLAVE?

La primera pregunta que nos hacemos, porque como no nos metemos tan seguido, ya no nos acordamos qué clave elegimos para entrar, así que te recomendamos que siempre tengas dos o tres opciones de clave para todas tus cosas.

Al entrar, verás muchas alternativas y te vas a sentir un poco abrumado, pero en Mis Servicios Online podrás encontrar todo lo que necesitas para hacer la declaración.

¿QUÉ SON LOS CONTRIBUYENTES?

Los contribuyentes son todas las personas que pagan impuestos, las que se dividen en dos categorías según su tipo de renta o ingresos (Omitamos la tercera categoría que es para superhéroes como yo, Superman o Batman).

PRIMERA CATEGORÍA:

Para explicarlo de la forma más simple, básicamente corresponden a las empresas, ya sean comerciales, industriales, mineras, etcétera, etcétera: clínicas, agencias de publicidad, constructoras, empresas de diversión, gimnasios y muuuuchas más.

SEGUNDA CATEGORÍA:

Las rentas de segunda categoría son relacionadas al trabajo: sueldos, salarios, gratificaciones, pensiones, etc. Es decir, la de cualquier persona natural que realiza un trabajo pagado por un tercero.

¿Y QUÉ SON LAS TASAS?

Las tazas son unos recipientes que sirven para beber líqui... ¡Ah! ¡Tazas! ¡Con S! Las tasas no son un impuesto, son el porcentaje de un pago que una persona como tú (o superhéroe como yo) hace por la utilización de un servicio.

¿Y POR QUÉ TENGO QUE HACER LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y QUÉ ME DEVUELVEN?

Durante todo el año, el estado cobra impuestos por las utilidades de empresas y trabajadores. En el caso de las rentas de segunda categoría, si los trabajadores independientes ganan menos de \$629.734 no deben pagar impuestos, pero si superan esta cifra, van pagando tasas más altas, que van de un 4% a un 35% como máximo, si tu salario es más de \$5.597.640 ¿Cómo te verías con ese sueldo? ¿Leyendo esto en alguna playa del Caribe?

BASE IMPONIBLE:

La Base Imponible es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de impuesto. Esto quiere decir, que es la magnitud que se utiliza en cada impuesto para medir la capacidad económica de cada sujeto, en otras palabras, es la valoración o magnitud que se emplea en el impuesto para la medición de la capacidad económica de la persona.

Ahora vamos a lo importante

¿CÓMO COBRO MI DEVOLUCIÓN?

Lo básico: primero, hay que hacer la declaración de impuestos entrando a la página del SII y siempre dentro del plazo que dan ellos (generalmente es en abril). Mientras antes la hagas, antes te llegará la devolución, así que te pasas de gil si la dejas para última hora.

Otro factor que influye en cuándo llegará tu devolución, es si elegiste que fuera por depósito, cheque o por caja de Banco Estado, si elegiste por depósito, podrás tener tu platita un poco antes para poder aprovecharla.

¿CÓMO NO HAN HECHO UN SISTEMA PARA PODER HACER LA DECLARACIÓN DESDE MI TELÉFONO?

¿Cómo que no? ¡Ya existe! ¡Se llama e-Renta y puedes descargarla desde tu teléfono! Así es mucho más fácil hacer tu declaración, es más simple, rápido y seguro. Capitán América me la recomendó y yo le di unas cajas de Kitadol Forte de agradecimiento.

Ahora puedes doblar este folleto, peinarte con él y hacerte el mejor peinado, porque ya tienes más que claro cómo funciona la declaración de renta y no pasarás ningún dolor de cabeza durante el proceso, que para muchos es hablar en Chino.

KITADOL FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
COMPOSICION Y PRESENTACION:
KITADOL FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol (Acetaminofeno) 500 mg

Cafeína anhidra 50 mg

Excipientes: Almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, colorante FD&C rojo N°40 lacado, celulosa microcristalina, colorante FD&C amarillo N°5 lacado, alcohol polivinílico, macrogol, dióxido de titanio, talco.

Alivio temporal de dolores de cabeza, resfríos, gripe, dolores musculares, dentales.

a) No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, a menos que el médico lo señale.

El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar severo daño hepático.

b) No usar en dosis mayores a las indicadas, pues puede provocar graves daños a la salud.

c) Existen muchos medicamentos que contienen paracetamol o cafeína en su fórmula. Si Usted está tomando otros medicamentos, debe verificar que ellos no contengan paracetamol o cafeína antes de usar este producto. Usted deberá comunicar al médico o al farmacéutico todos los medicamentos que está usando.

d) A menos que el médico indique lo contrario, este medicamento no deberá administrarse en forma conjunta con dipirona (metamizol), ácido acetilsalicílico u otros analgésicos o antiinflamatorios, como por ejemplo naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, entre otros.

e) Este fármaco provee alivio temporal a los síntomas descritos, pero en ningún caso resuelve el origen de ellos.

f) No usar este medicamento en mujeres embarazadas o en período de lactancia, sin antes consultar con el médico.

g) Este medicamento, en esta dosis, no es adecuado para niños.

h) No tomar más de 8 comprimidos (4 g de paracetamol) al día.

Este medicamento no debe ser usado en personas que presenten algunas de las siguientes afecciones, excepto si su médico lo indica:

- No se debería usar en personas con hipersensibilidad (alérgicos) al Paracetamol, cafeína o a algún componente de la fórmula. Informe a su médico o farmacéutico si ha presentado reacciones alérgicas a otros medicamentos, o preservantes o alimentos.

INDICACIONES:

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Si después de usarlo por el período de tiempo que el médico lo señale, los síntomas persisten o empeoran, se debe consultar nuevamente al médico.

CONTRAINDICACIONES:

- No deberá ser usado en personas con insuficiencia renal o hepática severas. No usar en pacientes alcohólicos. No usar en personas con úlcera gastroduodenal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe informar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de:

Fenotiazinas (un tipo de tranquilizante) (por ejemplo clorpromazina, tioridazina, flufenazina, etc), o con otros medicamentos usados para bajar la fiebre (por ejemplo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, dipirona, entre otros); puede producir hipotermia severa (disminución anormal de la temperatura corporal), anticoagulantes (acenocumarol, warfarina, entre otros); con ácido acético salicílico u otros analgésicos o antiinflamatorios, podría aumentar el riesgo de reacciones adversas de tipo renal; barbitúricos (por ejemplo fenobarbital), primidona, bloqueadores beta adrenérgicos (por ejemplo: atenolol, propranolol, betaxolol, timolol, etc), broncodilatadores adrenérgicos (por ejemplo salbutamol, salmeterol, fenoterol, etc), estimulantes (ejemplo: anfetamina, metanfetamina, pemolina,

metilfenidato, etc), suplementos de calcio, ciprofloxacino, enoxacino, anticonceptivos orales, eritromicina, fenitoína, litio, mexiletina, inhibidores de la monoamino oxidasa (ejemplo: moclobemida, selegilina, fenelzina, furazolidona, etc) uso de tabaco, aminofilina, teofilina.

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico si padece alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: enfermedades del hígado y/o hepatitis, enfermedades de los riñones, enfermedades hematológicas (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas), ansiedad, ataques de pánico, agorafobia, enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, insomnio, enfermedades gastrointestinales.

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretenden obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica.

Los siguientes efectos no deseados se pueden presentar en raras ocasiones y requieren atención médica en forma inmediata, como por ejemplo:

PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES:
EFFECTOS ADVERSOS (o no deseados):

- Ojos o piel amarilla, náuseas, vómitos.
- Dificultad para respirar, sudoración.
- Manchas, prurito (picazón) o moretones en la piel.
- Palidez o debilidad.
- Dolor de tipo renal.
- Disminución de la cantidad de orina.
- Orina oscura, coloreada, turbia o con sangre.
- Estimulación excesiva (vértigo, taquicardia, irritabilidad, nerviosismo).
- Irritación gastrointestinal.

Los siguientes efectos se pueden presentar una vez que discontinúe el uso de este medicamento: ansiedad, vértigos, dolor de cabeza, irritabilidad, tensión muscular, náuseas, nerviosismo, cansancio no habitual.

Si Ud. nota cualquier otro efecto no mencionado que Usted considere extraño, molesto o importante, consulte con el médico.

FORMA DE ADMINISTRACION:

Vía Oral.

Use este medicamento siguiendo las instrucciones, no use más o con mayor frecuencia que la que se le indique.

No consuma alcohol mientras esté usando este medicamento.

Evite consumir café mientras esté en tratamiento.

DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Adultos: 1 a 2 comprimidos por tres o cuatro veces al día.

Nunca exceder los 8 comprimidos en 24 horas.

SOBREDOSIS-INTOXICACION:

La intoxicación aguda (ingesta masiva del medicamento) puede manifestarse a las pocas horas con vómitos, náuseas, falta de apetito, dolor estomacal, agitación, ansiedad, confusión, orinar frecuentemente, taquicardia, fiebre, etc., puede además presentarse salivación profusa. En algunos pacientes, no se manifiestan síntomas. Síntomas de toxicidad hepática aparecen dentro de 2 a 4 días, pudiendo presentarse muerte entre 4 y 6 días. En caso de sospecha de intoxicación se presenten o no síntomas, debe inmediatamente llevar al paciente a un centro asistencial.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original, protegido del calor, la luz, la humedad a no más de 30°C y fuera del alcance de los niños. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.